

# 静观蛇舞

## ——蛇类的野外观察

撰文·供图 张亮



### 时间

蛇类喜欢在太阳光下进行日光浴,时间一般为10~14时左右。蛇享受日光浴时,一般伏于地面草丛或缠绕于树干上,也有半身裸露于洞口外、石头堆外面,呈盘蜷状,姿态变化多端。蛇类的活动规律因种类而异,以昼伏夜出居多。晚上,蛙类和啮齿类

活动非常活跃,容易吸引蛇来捕食,尤其天气闷热的夜晚8点到12点是蛇类活动的最高峰。

### 生境

生境中的食物和水源对蛇非常重要,只有找到吃的东西才会在这儿栖息。蛇会吃蟾蜍、青蛙,

天气热、昆虫非常多证明这个地方肯定会有蛙类。还有郊区生活垃圾会引来老鼠,老鼠必然会引来蛇。野外适合蛇类活动的生境有落叶层、林缘、岩洞、池塘、湿地、灌丛、溪流、农田和引水渠。

### 安全

如果用单反相机搭配标准镜头和长焦镜头,一来可以和蛇保持安全距离,二来可以拍出清晰的特写。进入树丛草丛时,穿长裤、鞋袜,手持强光电筒,也可以拿一根棍子,必要时可以用“打草惊蛇”的方法驱赶较凶猛的蛇。


拍摄某些具攻击性或有毒的蛇类首先要保持安全距离,不管它看上去有多温顺,都不要故意挑衅、玩弄毒蛇。在某种角度来讲,其实毒蛇越好拍,越是无毒的蛇对人的警惕性越高,胆子

冈氏竹叶青蛇 摄影/张亮




## 毒蛇咬伤急救处理

1. 保持镇静,勿紧急跑动,是自救的第一关键,因为毒性发作需要一段时间。
2. 认清毒蛇特征、形状、颜色及其他可能特征,可针对治疗。
3. 如被眼镜蛇、银环蛇、金环蛇咬伤应开创排毒。
4. 以弹性绷带、丝袜或绳子扎紧患肢,包扎范围愈大愈好,患肢保持低于心脏之位置,不要束太紧,维持血流畅通,定时松开,以免伤肢坏死。
5. 充份利用电话以及身边的人求助。



结扎



冲洗伤口和局部降温



穴位排毒

## 急救方法

1. 捆扎:最快的速度于咬伤上部超过1个关节或5~10厘米处扎紧,以阻断淋巴液与静脉血回流为度,在清创排毒后半小时,方可除去绑扎带。
2. 环封:手指的捆扎上方分多点注射地塞米松2支+普鲁卡因1支。
3. 治理:2%~5%高锰酸钾水2毫升往毒牙痕伤口内直接注射。如果能在100秒内注射完成,除眼镜王蛇外,其他蛇毒基本中和了,上面那两步也不用了。高锰酸钾是很强的氧化剂,对多种蛇毒有直接破坏作用。溶液即配即用效果较好。
4. 排毒:先用2%~5%高锰酸钾水,沿每个毒牙痕伤口内直接冲洗,然后用拔火罐对住伤口吮吸,尽可能地将毒吸出来;再扩大伤口用高锰酸钾水一边冲洗一边排毒,直到流出鲜血为止。全部动作最好不超3分钟。
5. 原则:毒蛇咬后3分钟内蛇毒尚有100%留在牙痕伤口处(除眼镜王蛇外),30分钟内还有70%的蛇毒留在牙痕伤口处。



吸吮或解压排毒 (本页图片来自网络)

越小。比如乌梢蛇、黄斑渔游蛇这类的无毒蛇就行动比较迅速，要费很大的周折去找。毒蛇不好动，像很多的蝮蛇，你离它们非常近都有可能无视你的存在；尤其是喜欢栖息低矮灌木上的竹叶青，但是不可以太接近，因为竹叶青具有颊窝的热感应器官，人如果太接近，在它面前就像“火球”，增强了它的攻击性。很多蛇都有自己独特的习性，可能是有一点的危险性，但是我们掌握了蛇的习性还是非常的安全。除了眼睛王蛇以外，没有任何一种蛇受到惊扰后会主动袭击人的，除非我们忽视了它最近的安全距离，无视它的存在它就会发起攻击。

(责编 桑新华)



百花曙蛇 摄影 / 张亮



三索颌腔蛇 摄影 / 张亮

### 蛇类生态观察准则

1. 观察者在观察时，不得捕捉野生蛇类。
2. 在拍摄时，请尊重并应善待拍摄对象，不进行人为引诱、挑衅、玩弄。
3. 不得伤害野生蛇类，不得对其进行人为的修饰、染色、印烙等处理。
4. 保护野生蛇类生活环境，不践踏破坏栖息地，保护栖息地中的水土、植被，不人为遗撒废物。

