

“深闺”俊美



撰文·供图 卢汰春 贺鹏
《鸟谱》供图 故宫出版社

今名: 红腹锦鸡、金鸡

Chrysolophus pictus

红腹锦鸡隶属于鸡形目雉科,是我国鸟类特有种,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长100厘米;羽色华丽,除上背浓绿色外,主要为金黄色;下体深红色,尾黑而密杂以桔红色斑点。仅分布于我国青海、甘肃、陕西、四川、云南、贵州、湖南和广西。多栖息于中低山灌丛、竹丛和陡峭岩坡及多岩台地。繁殖季节单独或成对活动。夜宿树上,善奔跑,选择隐蔽地点营巢。巢筑于地上,呈碗状或盘状,很简陋,仅垫少量杂草。每窝产6~8枚卵,卵呈灰黄白色,光滑无斑。



画名:白鹇



白鹇隶属于鸡形目雉科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长100~119厘米。上体白色,密布“Y”形黑纹;羽冠金属色。下体黑褐色,尾长,大都白色。分布于浙江、福建、安徽、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东、海南等省。多栖息于海拔1400~1800米的山地灌丛和竹丛间,夜栖于树上。主要食昆虫、植物叶、茎、果实和种子等。一雄多雌婚配制度。繁殖期雄性好斗,两颊的裸露部分开始增大,由暗红色变为鲜红色,羽毛富有光泽。雄鸟求偶时,环绕着雌鸟步行并有摆尾、击翅等动作。营巢于地面凹陷处,巢很简陋。每窝产4~6枚卵,卵呈淡棕褐色,布以白色斑点。


今名:白鹇

Lophura nycthemera

画名:吐绶鸡



今名:红腹角雉
Tragopan temminckii



红腹角雉隶属于鸡形目雉科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约60厘米。上体大都暗红色,满杂以灰色眼状斑,下体灰斑特别大而明显。分布于西藏、云南、陕西、四川、湖北、湖南等省。栖息于海拔1600~2400米的森林中,喜居有溪流的山涧、沟谷及较潮湿的悬岩下。主要吃植物的嫩叶、芽、枝、花蕾,也吃少量昆虫和盲蛛等。雄鸟发情时,在头顶黑亮的羽冠两侧伸出铅蓝色的肉角,项下伸出帷幔状的红蓝相嵌,中间深蓝色散布着许多浅蓝色斑点的肉裙。营巢于距地七八米高的大树上,每窝产3~5枚卵,呈土黄色或棕色,密布以黄褐色或紫褐色斑点。

画名: 弩克鸦克



今名: 冠斑犀鸟

Anthracoceros coronatus



冠斑犀鸟隶属于佛法僧目犀鸟科,被列为国家二级保护动物。体形较小,体长约70厘米。整个上体包括头侧、颈侧、两翅、颈、喉及胸部均呈黑色,闪铜绿色金属光泽。飞羽(除三级飞羽)和尾羽(除中央尾羽)具宽阔的白色端斑;腹、肛周、尾下覆羽及覆腿羽白色。嘴及盔突象牙黄色,盔突前端突出形成单角状,且具一大块黑斑。国内分布于云南南部及广西西南部。栖息于海拔620~1250米的林中高树上,结成小群活动,有时结

群在大榕树上寻觅榕果。杂食性,主要吃植物果实和昆虫等。营巢于高约40米的大树上的洞中,巢距地面约30米。洞口用泥封闭缩小,很光滑,仅留有10厘米长、5厘米宽的小口让雌鸟嘴端能伸出来吃雄鸟提供的食物。雏鸟和雌鸟均在洞中,直至雏鸟快出飞时才啄破洞口出来。



今名: 白冠长尾雉
Syrnaticus reevesii



白冠长尾雉隶属于鸡形目雉科,是我国鸟类特有种,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约170厘米,头、颈部均为白色,自嘴基经眼后有一黑色环。上体均金黄色,具黑缘;下体栗色具白色杂斑。见于陕西、四川、云南、安徽等省。常见于海拔300~2000米的山地森林,喜欢在农田附近的常绿阔叶林、落叶阔叶林和针阔混交林中活动。主要吃植物的根、茎、叶及种子、果实,也吃蜗牛、螺和昆虫。营地面巢,很简陋,常位于天然凹坑处,只稍稍加以修整,并利用附近植物作为铺垫。每窝产8~10枚卵,呈油灰色,有时为橄榄褐色。孵化期约28天。

画名：树鸡



今名：黑琴鸡
Lyrurus tetrix



黑琴鸡隶属于鸡形目松鸡科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约55厘米,体羽几乎全黑,具蓝绿色金属光泽。翅上具白色翼镜,尾呈叉状;外侧尾羽长而向外弯曲。分布于内蒙古、黑龙江、吉林、河北和新疆等省,栖息于开阔地附近的松林、桦树林和混交林中,主要吃植物嫩叶、枝、根、种子及昆虫。繁殖期有着特异的求偶炫耀:在开阔的求偶场(或称舞场),围绕着一棵幼树或一簇灌丛,半张着稍微下垂的翅膀,斜翘起竖琴状的尾羽,显露出尾下雪白的羽毛,弓颈,且不断地发出高亢的“gurururu——”的婚歌。营巢于地面,每窝产6~8枚卵,呈淡赭色,缀以深褐色斑点。

画名：鹧鸪



今名：勺鸡

Pucrasia macrolopha

勺鸡隶属于鸡形目雉科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约60厘米，头部具金属暗绿色，并具棕褐和黑色长羽冠；颈部两侧各有一白斑；体羽呈现灰色，具黑色纵纹；下体中央和下腹部深栗色。分布于西藏、陕西、甘肃、山西、四川、云南、辽宁、安徽、湖北、浙江、福建和广东等省。栖息于海拔1500~4000米的针叶林、落叶林，尤其是高低不平而灌丛密集的多岩坡地，夜宿于树上。主要吃植物嫩叶、芽、花、果实和种子等。营巢于灌丛间的地面上，亲鸟先在地上刨出一个桶状穴，再铺填枯草及落叶，每窝产5~7枚卵，呈乳黄色，缀以不规则的浅红或茶褐色的粗斑。

画名：金钱鸡




今名：灰孔雀雉

Polyplectron bicalcaratum



灰孔雀雉隶属于鸡形目雉科，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约65厘米。全身几为乌褐色，密布以近白色细点和横斑；背、双翅及尾均具金属蓝绿带紫色的眼状斑。分布于云南和海南等省，栖息于海拔150~1200米的热带雨林和季雨林中。常见于林下灌丛较为稠密阴湿的地面上。性胆怯而机警，发现危险时会长时间趴在地上一动不动，远看酷似一块山石。夜宿于树上，主要以昆虫、蠕虫及植物种子和果实等为食，是热带林栖鸟类。营地面巢，巢很简陋，仅用树枝、叶片和杂草堆积而成。每窝产2~5枚卵。



今名: 褐马鸡

Crossoptilon mantchuricum 种, 被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约90厘米。



褐马鸡隶属于鸡形目雉科, 为我国鸟类特有。雄鸟全长约90厘米。体羽主要为浓褐色, 头、颈部辉黑色; 耳羽簇白色, 呈短角状。脸部裸皮鲜红色。飞羽浅棕褐色; 腰和尾羽基部白色, 尾羽特长, 末端转黑, 中央尾羽特长而上翘, 羽枝披散下垂如散发状。分布于北京、河北、山西、陕西等省。栖息于山区森林地带, 白天活动于草、灌丛中, 夜宿于大树杈上。冬季多活动于1000~1500米的高山地带, 夏季多在1500~1800米的山谷、山坡和有泉水的山

坳里活动。主要以植物嫩枝、叶、芽、花蕾、果实、草籽等为食, 亦吃软体动物、蜈蚣、蜘蛛和昆虫等动物性食物。除繁殖季节多单个或成对活动外, 多成数只或几十只乃至一百多只结群活动。每年5月初开始营巢, 营巢于海拔1650~1800米人迹罕至且隐蔽条件较好的密林中, 巢筑于小坡大树下或柴堆下的地面上。每窝产9~14枚卵, 卵色不一, 以淡褐、鸭蛋青色为主。

画名：山花鸡



今名：黄腹角雉


Tragopan caboti

黄腹角雉隶属于鸡形目雉科，是我国鸟类特有种，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约65厘米，羽色艳丽，背羽栗色，布满卵圆形黄斑；头顶具黑色及橙红色羽冠，其下掩盖着一对翠蓝色肉角，发情时会竖直伸出。脸、颊及喉部裸露的皮肤呈鲜橙红色，喉下隐有肉裙，发情时下垂；腹部纯黄色。分布于浙江、江西、福建、广东、广西和湖南等省。栖息于亚高山常绿阔叶林和常绿针叶林。不善飞行，喜奔走。主要吃植物的嫩叶、茎、花、果实及种子，也吃少量昆虫和蜘蛛。营巢于距地面3~9米的大树上，巢很简陋，多利用巢址附近的落叶、苔藓稍加修饰而成。每窝产2~6枚卵，呈土棕色，密布以红褐色斑点及稀疏的灰紫色大班。



今名: 鸿雁

Anser cygnoides



鸿雁隶属于雁形目鸭科。雄鸟全长82~90厘米。上体大都浅灰褐色,自头顶至后颈正中棕褐色;下体近白。分布于东北、内蒙古、新疆、青海、四川、河北、河南、山西、长江中下游、福建、广东和台湾。栖息于旷野、河川、湖泊、沼泽,特别是水草植物丛生的水边,亦见于山区、平原和海湾等处。性好结群,迁徙时常汇聚成数百上千只的大群,飞行时常排成“一”字形或“人”字形,飞行速度缓慢,徐徐向前。主要吃各种草本植物,包括水生和陆生植物、藻类及少量的软体动物。营巢

于草原湖泊岸边沼泽地带的芦苇丛中,亦在靠近山地的河流岸边。巢常用芦苇和干草构成,内垫以细软的禾本科植物、干草和绒羽。每窝产4~8枚卵,呈乳白或浅黄色。


画名：黑嘴天鹅



今名：小天鹅、短嘴天鹅

Cygnus columbianus

小天鹅隶属于雁形目鸭科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长110厘米。全身纯白，颈较大天鹅稍短，在水面上时颈微曲。嘴基部的黄斑不前伸至鼻孔下。分布于新疆、东北、河北、河南、甘肃、山西、四川、山东、长江流域、浙江、福建、广东和台湾等地。栖息于河谷、沼泽以及江河、湖泊等处。性活泼，常一起鸣叫，叫声颇为清脆，故有啸声天鹅之称。主要吃水生植物、草类、谷物，也吃蠕虫、昆虫和小鱼。营巢于河堤芦苇丛中，每窝产5~7枚卵，呈白色。



画名: 金头天鹅



今名: 大天鹅、黑嘴天鹅
Cygnus cygnus



大天鹅隶属于雁形目鸭科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长140厘米。全体洁白,颈长,在水面常伸直;嘴基部的黄斑伸至鼻孔之下。栖息于多芦苇的大型湖泊、池塘和沼泽地,性机警,难以接近。飞行迅速,离地面有时很高,还可以伸直颈部和脚接近水面做长距离飞行。在水面浮游时,将颈部伸直,与身躯大都成直角。主要吃植物根、茎、叶,也吃蚯蚓、虾类和软体动物。多营巢于干燥地面或浅滩的芦苇间的地面上,每窝产4~6枚卵,白色或象牙色。

画名：红嘴天鹅



今名：疣鼻天鹅、赤嘴天鹅
Cygna olor



疣鼻天鹅隶属于雁形目鸭科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长140厘米。全身洁白，鼻甲基部的疣状突和鼻膜黑色；跗蹠、趾和蹼为黑色。栖息于水草繁茂的河湾、开阔湖面。主要吃植物嫩茎、叶、芽、种子、谷物，也吃昆虫及其他小型动物。营巢于潮湿地面上，以水草、茎、叶等构成平台状，每窝产5~7枚卵，呈青绿近白色。

画名: 绿头鸭



今名: 绿头鸭
Anas platyrhynchos



绿头鸭隶属于雁形目鸭科。雄鸟全长60厘米左右。头至颈部亮蓝绿色,颈具白环;上体大都灰褐、下体灰白色;中央尾羽向上弯曲,翼镜蓝紫色具白色宽缘。分布于全国各地,栖息于湖泊、池塘、水库、江河等地。白天在岸边活动、休息,略有动静便立即飞走。杂食性,主要吃野草种子、茎、叶、谷物、藻类和昆虫等。营巢于湖泊、河流、水库、池塘等水域岸边的草丛中或倒木下的凹坑处,巢由草茎、蒲草、苔藓等构成。每窝产7~11枚卵,呈白色或绿灰色。

画名：凤头鱼鸭



今名：中华秋沙鸭

Mergus squamatus



中华秋沙鸭隶属于雁形目鸭科鸟类，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约60厘米。鼻孔位于嘴锋中部；冠羽长而成双冠状，头和上背均黑，下背、腰和尾上覆羽白色，翅上有白色翼镜；下体白，体侧有黑色鳞片状斑。分布于黑龙江（繁殖鸟），迁徙时路过河北，至长江流域以南的广大地区越冬。栖息于阔叶林或针阔混交林的溪流、河谷、草甸、水塘及草甸等处。性机警，稍有动静就昂首缩颈不动，随即起飞或迅速游到隐蔽处。主要吃水生昆虫、虾、杜父鱼、红点蛙、细鳞鱼等水生动物。营巢于森林溪流两岸靠近河边大树上的天然树洞中，距地面高4~11米，洞内除木屑外还有大量从其自身上拔下的羽毛和少量杂草。每窝产8~12枚卵，呈椭圆形，白色，光洁无斑。

画名：鸳鸯



今名：鸳鸯
Aix galericulata



鸳鸯隶属于雁形目鸭科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约40厘米，羽色华丽鲜艳，头具羽冠，眼后具白色眉纹，翅上有一对栗黄色扇状直立羽，非常明显。分布于东北、河北、河南、山西、山东、甘肃、四川、长江中下游、福建、台湾、广东、广西等地。栖息于山地河谷、溪流，常见于阔叶林、针阔混交林的沼泽、芦苇塘、湖泊。杂食性，主要吃草籽、橡子、玉米、稻谷、青苔以及蛙、鱼、蜗牛、昆虫等。营巢于紧靠水边的老树上的天然树洞中，距地高10~18米，洞内除树木碎屑外，还有自身脱落的羽毛。每窝产7~12枚卵，呈圆形，白色而光滑无斑。

画名：鹤



今名：东方白鹤
Ciconia boyciana



东方白鹤隶属于鹤形目鹤科，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约120厘米。除翅为黑色外，其余体羽大都白色；嘴厚而侧扁，不具鼻沟，中趾及爪不具栉缘。分布于黑龙江、江西、湖南、湖北、安徽、江苏等，偶见于四川、西藏、福建、广东、香港和台湾。性宁静而机警，飞行及步行时举止缓慢，休息时单足站立。主要以鱼类为食，也吃蛙、小型啮齿类、蛇、蜥蜴、软体动物、甲壳类、环节动物、昆虫及雏鸟等。栖息于沼泽、湿地、湖泊，在水边涉水觅食。营巢于树上和房屋顶上，距地面高3~17米，由树枝堆积而成，内垫以枯草、绒羽和苔藓。每窝产4~6枚卵，呈长椭圆形或卵圆形、梨形，白色或浅蓝色，具少许褐色斑。

画名：黑鹳



今名：黑鹳
Ciconia nigra

黑鹳隶属于鹳形目鹳科，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约110厘米。头、颈、背、翅和尾概为黑褐色，腹为白色；嘴和脚均呈红色。分布于新疆、青海、甘肃、内蒙古、四川、东北、河北、河南、陕西、云南、广东、广西、湖南、长江下游、福建和台湾等地。栖息于森林河谷、沼泽地带、荒山附近的湖泊、水库、水渠、溪流、水塘等地。性孤僻，常单独或成对活动。主要以鱼类为食，也吃蛙、蜥蜴、虾、蟋蟀、蟹、蜗牛、软体动物、甲壳动物、啮齿类、爬行类、雏鸟及昆虫等。营巢于森林、荒原或荒山的河流两岸的悬崖峭壁上或被雨水急剧冲刷的干河或深沟两壁的悬崖上，巢随年限增加而增大。每窝产4~5枚卵，呈椭圆形，白色无斑点。

画名：羊鸨



今名：大鸨

Otis tarda

大鸨隶属于鹤形目鸨科，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约100厘米。头、颈及前胸灰色，其余上体栗棕色，密布宽阔的黑色横斑；下体灰白色，颈下有细长的须状纤羽向两侧伸出。当雄鸟争斗时，此羽可竖起。在内蒙古、黑龙江、吉林等地繁殖，在黄河中下游越冬，偶见于湖北、江西、安徽和福建。营巢于广阔草原、半荒漠地带及农田草地。不善飞行，善于奔跑，性机警，很难接近。主要以嫩绿的野草为食，兼食昆虫、鱼类、蛙类等。营巢于干燥草原岗上，亦见于农田中，仅在地面挖一浅坑，无巢材，只将草作为铺垫。每窝产2~4枚卵，呈暗绿或橄榄色，缀以浅褐色或深褐色斑点。



今名：白鹈鹕

Pelecanus onocrotalus

白鹈鹕隶属于鹈形目鹈鹕科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约160厘米。体羽粉白，仅初级和次级飞羽黑褐色。头后具羽冠，胸部具黄色羽毛。分布于新疆、青海等地。栖息于湖泊、江河、沼泽等地。善飞行和游泳，亦能在地上行走。飞行时头向后缩，颈弯曲成S形，双翅鼓动缓慢而有力，能翱翔或滑翔。在水中游泳时，颈常呈Z形。主要以鱼类为食。成群地在一起营巢，巢位于湖中小岛或芦苇浅滩，亦见于河流岸边和沼泽地上，也有在树上营巢的。巢较为庞大，由树枝、枯草和水生植物构成。每窝产2~4枚卵，刚产出为白色，后变为黄褐色。



今名：鸛

Pandion haliaetus



鸛隶属于隼形目鹰科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约50厘米。头顶和后颈白色，有黑色纵纹。上体暗褐，背部有白色小斑，从耳羽到颈侧有黑色纵纹。下体白，上胸有棕褐色粗纹。分布于东北、东南沿海、海南(留鸟)；新疆、甘肃、西藏(夏候鸟)；内蒙古、华北沿海一带(旅鸟)。栖息于水域附近，常见于江河、湖泊、水库、海滨和沼泽。为水域猛禽，常在空中翱翔，或在大树和水中木桩上静立，有时在空中定点振翅。主要吃鱼类。营巢于近水乔木上或岛屿岩礁上，一个巢可沿用数年。巢由树枝、灌木、枯草、苔藓等构成，铺垫以树皮、枯草、羽毛和碎纸等。每窝产2~4枚卵，呈椭圆形，灰白色，缀以赤褐色粗纹。



画名: 狗头雕



今名: 胡兀鹫

Gypsaetus barbatus

胡兀鹫隶属于隼形目鹰科,被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约111厘米。上体黑褐,有银灰色光泽;颌下有一簇黑色羽簇。分布于新疆、青海、宁夏、山西、甘肃,偶见于云南、湖北、河北、辽宁和内蒙古。栖息于高原和高山裸岩地带,多在海拔1000~5600米的高山地带活动,甚至可在喜马拉雅达7000米以上的地方见到。性孤独,常单独在山顶或山坡上缓慢飞行和翱翔,头向下低垂,眼盯着地面寻觅动物尸体。主要以大型动物尸体为食,特别喜欢新鲜尸体,有时猎取水禽、野生鸡类和野兔等。营巢于高山悬崖峭壁上的大的缝隙和岩洞中。巢呈盘状,主要由枯枝构成,内垫以枯草、细枝、棉花等。每窝产1~3枚卵,呈钝卵圆形,暗灰或赭土色,缀以红褐色或褐色斑点。

画名: 接白雕



今名: 金雕
Aquila chrysaetos



金雕隶属于隼形目鹰科,被列为国家一级保护动物。雄鸟全长78~85厘米。后头和后颈羽毛尖锐,呈金属黄色,体羽一般为栗褐色,翅下有一块白斑,飞行时十分明显。下体黑褐色。分布于东北西北部(繁殖鸟);东北乌苏里江、鸭绿江(旅鸟、冬候鸟);新疆、青海、甘肃、山西、河北、陕西、湖北、四川、云南等地(留鸟)。栖息于高山草原、荒漠、河谷和森林地带,分布最高海拔达4000米以上。主要吃大型鸟类和兽类,如雉鸡、鹌、鸭、旱獭、狍、山羊、鼠兔、松鼠和狐狸等。营巢于针叶林、针阔混交林的高大红松和落叶松的大树上,距地高10~20米,呈盘状,有枯草、树枝等堆积而成,内垫以细树枝、枯草等。每窝产1~3枚卵,呈白色或青灰白色,缀以红褐色斑纹。

画名：花白雕



今名：玉带海雕

Haliaeetus leucoryphus



玉带海雕隶属于隼形目鹰科,被列为国家一级保护动物。雄鸟全长76厘米左右。上体暗褐色,下体棕褐色。尾羽褐色,具一道白色宽带斑,尾尖黑色。分布于新疆、青海、内蒙古、东北、西藏南部(繁殖鸟);内蒙古、甘肃、四川(旅鸟);河北、山西、江苏(偶见)。栖息于有湖泊、河流和水塘等开阔水域的地区,无论是高原还是平原的湖泊都可见。主要以鱼和水禽为食,如水鸭、大雁、天鹅幼雏和其他鸟类,也吃蛙和爬行动物。通常营巢于湖泊、河流和沼泽岸边高大乔木上,偶见于渔村附近,在离水域较远的树上筑巢。巢的结构较庞大,由枯树枝和芦苇构成。每窝产2~4枚卵,纯白无斑点。

画名：倒插雕



今名：白尾海雕
Haliaeetus albicilla



白尾海雕隶属于隼形目鹰科，被列为国家一级保护动物。雄鸟全长约86厘米。上体土褐色；胸和腹褐色，羽缘浅淡；尾纯白色，尾下覆羽淡棕色。飞行时，双翅宽广、平直呈长方形，尾呈扇状。分布于东北北部（繁殖鸟）；东北南部、河北、山西以至长江（旅鸟）；青海、甘肃、长江以南沿海地区及台湾（冬候鸟）。栖息于海滨、江河等地。繁殖期也见于山地草原，平时多单独活动。飞行缓慢，呈直线飞行，大多停留在岩石、乔木或地面上。取食鱼类、野兔、鼠类、野鸭等，也吃动物尸体。营巢于湖边、河岸附近的高大乔木和岸边岩壁上，由树枝堆成浅盘状，内垫以苔藓、枯草。巢可连续使用。每窝产2~3枚卵，白色无斑。孵化期35天左右。

画名：笼黄鹰



今名：游隼
Falco peregrinus



游隼隶属于隼形目隼科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长41~49厘米。上体暗褐;头、后颈、颊和耳羽具黑褐色纵纹;黑色髭非常显著;下体色淡,布满黑色横带。分布于从东北到华北的广大地区(旅鸟);长江以南至广东以及台湾(冬候鸟)。主要捕食鸭、鸥、鸠鸽类,偶吃鼠类和野兔等。营巢于土丘,甚至沼泽地。巢主要由枯枝构成,内垫以少许草茎、草叶和羽毛。每窝产2~6枚卵,呈红褐色。

画名：笼松儿



今名：松雀鹰
Accipiter virgatus



松雀鹰隶属于隼形目鹰科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长25~26厘米。上体石板黑色；喉白，具显著的中央条纹；嘴长不及中趾的一半；胸、腹白色或灰白色，缀以棕褐色横斑。分布较广，见于东北大部、河北（繁殖鸟或旅鸟）；东北南部、山东、河南至台湾、广东西南（冬候鸟）；西藏南部、云南、陕西、四川、广东、海南和台湾（留鸟）。栖息于针叶林、常绿阔叶林和开阔的林缘疏林。冬时亦飞到山脚和平原地带的小块丛林、竹园和河谷地带。性机警，常站在林缘高大的枯树顶枝上。主要吃各种小鸟，也吃蜥蜴、昆虫和小型鼠类。营巢于茂密森林中枝叶繁茂的高大树木上部，由细树枝构成，内垫以绿叶。每窝产3~5枚卵，呈白色，缀以灰色云状斑和红褐色斑点。



画名：风鹰

今名：凤头鹰

Accipiter trivirgatus



凤头鹰隶属于隼形目鹰科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约40厘米。头具显著冠羽；尾羽褐色，具4道宽阔的暗褐色横斑；喉白色，具宽阔黑纵纹；上胸有纵纹，下腹有横斑。飞行时，双翅短圆，后缘突出。分布于四川、云南、贵州、广西、广东、台湾和海南等地。栖息于海拔2000米以下的山地森林和山脚林缘地带，以及竹林和小面积丛林地带。性机警，善隐藏。日行性，多单独活动。主要吃蛙、蜥蜴、鼠类、昆虫，也吃鸟类和小型哺乳动物。营巢于针叶林或阔叶林中高大的树上，距地面6~30米。巢较粗糙，主要由树枝堆积而成，内垫一些绿叶。营巢位置多在河岸或水塘离水域不远的大树上。每窝产2~3枚卵，呈椭圆形。

画名：老皂雕



今名：秃鹫
Aegypius monachus




秃鹫隶属于隼形目鹰科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约110厘米。头部被稀疏褐色绒羽，颈的裸出部位铅蓝色，皱领淡褐近白。全身大都为褐色。分布于全国大多数地区，从新疆、青海、甘肃、宁夏、四川至华北、东北，偶见于江苏、浙江、福建、台湾、广东和云南。栖息于高山荒原和森林中的荒岩草地、山谷溪流和林缘地带，以及低山丘陵地带。白天活动，常在高空悠闲地翱翔和滑翔。主要以大型动物尸体为食，主动攻击中小型兽类、两栖类、爬行类和鸟类，有时也袭击家畜。营巢于森林上部，也见于裸露岩石上，因常用旧巢，使巢变得越来越大，呈盘状，由枯树枝堆积而成，内垫以枝条、草、叶和树皮等。每窝产6~10枚卵，呈白色，缀以红褐色条纹和斑点。

画名: 黄花豹



今名: 棕尾鵟
Buteo rufinus

棕尾鵟隶属于隼形目鹰科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长60厘米左右。上体褐色,第2~5枚初级飞羽外翮具横斑;下体棕白色,尾羽棕褐。分布于新疆西部、甘肃(留鸟);西藏南部和云南(旅鸟、冬候鸟)。栖息于海拔2000~4000米的荒漠、半荒漠、草原、无树平原。常单独活动,行动显得迟缓而笨拙,常站在地上、岩石、电线杆上或地面高处。主要以野兔、啮齿动物、蛙、蜥蜴和鸟类及其卵为食,也吃死鱼和其他动物尸体。营巢于悬崖岩石上或树上,由枯树枝构成,内垫以枯草。每窝产3~5枚卵,呈白色或皮黄白色,缀以黄色或红褐色斑点。



今名: 灰背隼 *Falco columbarius*



灰背隼隶属于隼形目隼科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约29厘米。上体蓝灰色,各羽均具黑色羽干纹;后颈有一道棕色杂以黑斑的领圈;胸、腹和两胁有棕褐色粗纹;尾具宽的次端斑。分布于新疆(留鸟);东北大部(旅鸟);福建、云南、青海、四川等地(冬候鸟)。栖息于开阔的低地山丘、山脚平原、森林平原、海岸和森林苔原。常单独活动,多在低空飞翔,休息于地上或树上。主要吃小型鼠类、鸟类和昆虫,有时也吃蜥蜴、蛙和小型蛇类。营巢于树上或悬崖岩石上,亦见于地面上。多占用乌鸦、喜鹊和其他鸟类的旧巢,有时也自己筑巢。巢的结构简陋,由树枝构成,呈浅盘状。每窝产2~7枚卵,呈白色,缀以红褐色斑点。

画名: 黄鵟鷹

今名: 普通鵟
Buteo buteo

普通鵟隶属于隼形目鷹科,被列为国家二级保护动物。雄鸟全长50~56厘米。羽色变化很大,有黑色型和棕色型两种。上体和下体暗色(黑色型)或淡色(棕色型),具暗色斑纹,髭纹黑褐色;翅下有淡色大型斑;尾稍圆。分布于新疆(夏候鸟);东北大部(繁殖、旅鸟);青海、四川、河北、河南、山东(旅鸟);云南、西藏、海南(冬候鸟);台湾(迷鸟)。栖息于山地和山脚平原和草原地带,亦见于高山林缘和开阔山地。主要吃啮齿动物、蛙、蜥蜴、野兔、蛇类和鸟类等。营巢于悬崖峭壁上和树上。巢呈盘状,由树枝构成,内垫以干草、毛、羽毛和碎布。每窝产2~5枚卵,呈淡赭黄色,缀以红褐色和鼠灰色斑点。



今名：白尾鵟

Circus cyaneus



白尾鵟隶属于隼形目鷹科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约48厘米。上体包括两翅大都蓝灰色；尾上覆羽白色；腹和两胁、翅下覆羽及覆腿羽均白。分布于新疆、东北、河北、山东、山西、陕西、四川（旅鸟）；甘肃、青海、长江中下游、福建、广东、广西、云南及西藏南部（旅鸟、冬候鸟）；台湾（迷鸟）。栖息于平原和低山丘陵地带，尤其是平原上的沼泽、湖泊、河谷、草原、荒野及低山林间沼泽、草地、农田耕地、沿海沼泽和芦苇塘等开阔地区。主要吃小型鸟类、鼠类、蛙、蜥蜴、昆虫等。营巢于芦苇丛、草丛或灌丛间的地上。巢由芦苇、蒲草、细枝构成，呈浅盘状。每窝产4~5枚卵，呈浅绿或白色，缀以肉桂色或红褐色斑点。

画名：狼鸮



今名：雕鸮
Bubo bubo



雕鸮隶属于鸮形目鸮科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长70厘米左右。通体羽毛大都黄色，具白色喉斑。胸、肋具浓密浅黑色条纹，腹及尾下覆羽有狭小黑色横纹。分布遍及全国。栖息于海拔2500~4500米的山地林木、裸露岩石或峭壁上。夜行性，拂晓后即返回栖息地。白天在密林中休息，缩颈闭目，一动不动；黄昏时飞出觅食。主要吃啮齿动物，如黑线姬鼠、褐家鼠、小家鼠、社鼠等。筑巢于峭壁突出处的石崖下面，比较平坦，附近有浓密灌丛下的干燥地方，呈小坑状，巢内无任何铺垫物。每窝产2~3枚卵，呈椭圆形，卵为白色。

画名：云头花豹



今名：褐林鸮

Strix leptogrammica

褐林鸮隶属于鸮形目鸮科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长50厘米左右。通体栗褐色，有白色或棕白色眉纹，眼圈黑色，脸盘棕褐或棕白色，在肩、翅及尾上覆羽有黄白色横斑。分布于浙江、江西、福建、台湾和广东。栖息于茂密的山地森林，尤其是常绿阔叶林和混交林，亦见于林缘、路边稀林。夜行性，性机警而胆怯，稍有声音，立即飞离。主要吃鼠类、小鸟，也吃蜥蜴和蛙等。营巢于天然树洞和岩壁洞穴中，离地高5米，内垫以枯树枝。每窝产1~2枚卵。

画名：矛鸱



今名：雪鸱
Nyctea scandiaca



雪鸱隶属于鸱形目鸱鸱科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长60厘米左右。全身羽毛白色，具褐斑；眼先和面片稍染浅褐色；头顶杂有少数黑褐色斑点；下体腹部具窄的褐色横斑。分布于新疆、黑龙江、辽宁、陕西等省（冬候鸟）。夏季栖息于北极冻原带、冻原苔原丘陵、海岸和邻近荒原和沼泽，冬季曾见于新疆天山海拔3000米以上的针叶林。白天活动和捕食。主要吃旅鼠和雪兔，也吃啮齿类、鸟类，甚至雉鸡、鸭类和雁类。营巢于苔原地上，尤其是较为干燥的小山坡上，仅是在地面上扒一小坑。每窝产4~7枚卵，呈椭圆形，白色。

画名：树猫儿



今名：鹰鸮
Ninox scutulata



鹰鸮隶属于鸮形目鸮科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长30厘米左右。上体暗棕褐色，前额近白色，肩附近有不规则白色块斑；喉和前颈皮黄色具褐色条纹；其余下体白色，有大型水滴状红褐色点斑，并形成完整的横斑；尾羽有黑色及白色横斑。栖息于原始针叶林和针阔混交林，亦见于森林苔原和平原森林地带。昼行性，白天活动和觅食，休息时多栖于树顶或电杆上。分布于北京、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、台湾和香港等地。主要吃啮齿类、野兔、鸟类如山鹑和松鸡，以及其他小型动物。营巢于枯树顶端树杈，也利用乌鸦和喜鹊等鸟类的旧巢。每窝产3~13枚卵，呈白色。

画名：夜猫儿



今名：灰林鸮
Strix aluco



灰林鸮隶属于鸮形目鸮科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约42厘米。头圆，没有长耳羽簇；上体暗灰，呈棕、黑斑杂状；下体白或皮黄色，胸部沾黄，具浓密条纹及细小虫霉斑。分布于东北、甘肃、河北、陕西、山东、湖北、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南等地。栖息于海拔2500米以下的山地阔叶林和混交林中，尤喜河岸和沟谷森林地带及林缘疏林和灌丛地带。夜行性。主要以啮齿类、小鸟、蛙、昆虫等为食，偶尔吃鱼类。营巢于树洞，以及岩石下的地面或利用鸦类的旧巢。每窝产1~8枚卵。



今名：长耳鸮

Asio otus



长耳鸮隶属于鸮形目鸮科，被列为国家二级保护动物。雄鸟全长约38厘米。上体棕黄及黑褐色斑纹相杂，显得十分斑驳；下体棕黄，杂以黑褐色有横斑的纵纹；头顶有两簇具黑色及皮黄色斑纹的长羽，竖立呈耳状；面盘发达。分布于黑龙江、辽宁、内蒙古、青海（繁殖鸟）；冬时几乎遍布全国。栖息于针叶林、针阔混交林和阔叶林，亦见于林缘疏林和农田护林带。夜行性。主要吃啮齿类、鸟类及昆虫。营巢于森林中，常利用乌鸦、喜鹊或其他猛禽的旧巢，有时也在树洞中营巢。每窝产3~8枚卵，呈圆形，白色。

（责编 李瑄 桑新华）