



白眼潜鸭：身长41厘米，俗名白眼鳧。雄鸟眼白，尾下白，体圆，头大，很少鸣叫。为深水鸟类，善于收拢翅膀潜水。杂食性，主要以水生植物和鱼虾贝壳类为食。多栖息于富有水生生物和苇丛的淡水或半咸水的湖泊及低湿地。怯生谨慎，成对或成小群
(拍摄于北京野鸭湖)

看鸟儿洗澡

撰文·摄影 徐永春

鸟类洗澡

洗澡和梳羽是鸟类保持身体清洁、减少疾病发生的重要习性。鸟儿不论大小、种类都要洗澡和梳羽。威猛彪悍的大型猛禽涉禽，洗起澡来温文尔雅；袖珍娇小的林鸟，洗起澡来干净利索；水禽鸭子洗起澡来天翻地覆，动静最大……

由于地理环境和鸟的习性的不同，鸟类洗澡大致分为水浴和沙浴。大部分鸟类采取水浴，而地栖性鸟类（如百灵、麻雀、雉类等）也有沙浴的习惯。鸟儿洗澡、清理全身的羽毛，还可以驱除羽毛上的寄生虫，有助于飞行的顺畅和身体健康。

拍摄取位

通常，在条件容许的情况下，要考虑选取低机位和暗背景，以及拍摄的光照角度。

低角度、暗背景和侧逆光，可以使鸟洗澡溅起来的水花更加明亮，场景更加生动鲜活。


快门速度

拍摄鸟类洗澡都是在活动中抓取，所以快门速度不能过慢，一般应在1/250秒以上。



快门速度越快，拍摄的鸟翅膀和水珠就越清晰；快门速度越慢，拍摄的鸟翅膀就越模糊，水珠拉成的线条就越长。

虽然，鸟洗澡时翅膀的动作频率是很快的（鸟越小频率越快），但是头部却有相对静止不动的瞬间，所以要根据具体情况设置快门速度，从而达到理想的拍摄效果。通常，拍摄鸟类洗澡是使用望远镜头，在弱光下大光圈拍摄时，还要考虑景深对水珠或水线展现层次的影响。

（责编 桑新华）




- 上: 红翅黑鹇: 身长23厘米, 脸侧及初级飞羽绯红。体羽余部大致灰褐。方形的尾黑色, 尾端橘黄。罕见于云南 (拍摄于云南百花岭)
- 中: 红颈滨鹇: 身长15厘米, 灰褐色。腿黑, 上体色浅而具纵纹。喜沿海滩涂, 结大群活动, 性活跃, 敏捷行走或奔跑, 拣起食物或兴奋时头上下点动或往上一甩 (拍摄于北京野鸭湖)
- 下: 黑耳鸢: 身长65厘米的深褐色猛禽。尾略显分叉, 飞行时初级飞羽基部具明显的浅色次端斑纹。似黑鸢但耳羽黑色, 体型较大, 翼上斑块较白。常见并分布广泛, 为中国最常见的猛禽之一 (拍摄于北京野鸭湖)



上: 灰翅鸫: 身长28厘米, 俗名灰膀鸫。雄鸟似乌鸫, 全身黑色但双翼灰色, 腹部具鳞斑。在我国分布于四川、贵州、云南、广西等地, 一般生活于海拔1 200~3 000米的湿润而稠密的橡树和杜鹃等阔叶林, 冬季常出没于树林、灌丛和乡村的田园里 (拍摄于云南百花岭)

中: 大仙鹟: 身长21厘米的深色鹟。雄鸟上体蓝色。雌鸟橄榄褐色。亚成鸟褐色。头具白色细点, 背多锈色点斑, 下体具黑色鳞状斑 (拍摄于云南百花岭)

下: 白鹡鸰: 身长20厘米, 俗名白颡儿、白面鸟。黑白相间, 亚种较多。我国常见鸟类, 喜在离水较近的耕地附近, 路边等处也可见到。呈一上一下地起伏式飞行, 尾巴不断上下摆动哆嗦式行走。以昆虫及种子为食 (拍摄于北京野鸭湖)






上: 黑头奇鹇: 身长24厘米的长尾灰色奇鹇。常见于我国中南部及南部海拔1 200米以上的山区森林。不甚怕人, 性甚隐秘且动作笨拙 (拍摄于云南百花岭)

中: 戴菊: 身长9厘米, 色彩明快, 偏绿色, 似柳莺。数量很少, 不易见到。总是不停地在松树枝间寻找食物, 发出很微弱的吱吱声。以昆虫为食 (拍摄于北京天坛)

下: 乌林鸮: 身长65厘米的灰色鸮。无耳羽簇, 面庞具独特深浅色同心圆, 眼鲜黄色。罕见的留鸟, 活动于800~1 800米的针叶林、针阔混交林中, 栖息在以落叶松、白桦为主的混交林。性机警, 飞翔迅速无声, 昼伏夜出 (拍摄于内蒙古乌拉旗杆)






上: 灰翅雀鹛: 身长14厘米的喧闹而好奇的群栖型雀鹛。上体褐色, 头灰, 下体灰皮黄色。具明显的白色眼圈。深色侧冠纹从显著至几乎缺乏。与褐脸雀鹛的区别在下体偏白, 脸颊多灰色且眼圈白色 (拍摄于云南百花岭)

中: 黑翅长脚鹬: 身长37厘米的黑白色涉禽, 特征为高挑、修长。细长的嘴黑色, 两翼黑, 长长的腿红色, 体羽白, 颈背具黑色斑块


下: 金斑鸻: 身长25厘米的健壮涉禽, 头大, 嘴短厚, 整个上体呈黑色与金黄色斑, 喜开阔多草地区 (中、下图均拍摄于北京野鸭湖)




上: 赤嘴潜鸭: 身长55厘米的皮黄色鸭。繁殖期雄鸟橘红色的嘴与黑色前半身成对比。雌鸟为褐色, 嘴黑灰色 (拍摄于北京颐和园)
 中: 小鸊鷉: 身长27厘米而矮扁的深色鸊鷉, 尾短, 翅短, 腿短(长在身体的后部, 近尾端), 使得它的体形近乎椭圆, 有人叫它为水葫芦, 潜水高手, 中国最常见的水鸟之一 (中、下图均拍摄于北京圆明园)
 下: 红喉姬鸊: 身长13厘米的褐色鸊。在东北地区繁殖, 在南部沿海、海南越冬, 迁徙时遍及东部地区



上: 凤头麦鸡: 身长30厘米的黑白色麦鸡。具长窄的黑色反翻型凤头, 上体具绿黑色金属光泽, 叫声独特, 似拖长的鼻音
下: 大天鹅: 身长155厘米的白色天鹅。嘴黑, 嘴基有大片黄色。叫声如响亮而忧郁的号角声。分布于北欧、亚洲北部, 越冬在中欧、中亚及中国 (上、下图均拍摄于北京野鸭湖)





上：银鸥：身长64厘米的浅灰色鸥。腿淡粉红色，上体浅灰。亚成鸟具褐色杂斑，嘴黑色。银鸥是一种松散的群居性鸟类，常几十只或成百只一起活动（拍摄于北京野鸭湖）

下：丹顶鹤：身长150厘米而优雅的白色鹤。丹顶鹤是鹤类中的一种，因头顶有红肉冠而得名。它是东亚地区所特有的鸟种，因体态优雅、颜色分明，在这一地区的文化中具有吉祥、忠贞、长寿的寓意（拍摄于吉林莫莫格）

